

# アルゴリズムとデータ構造⑤

## ～順序統計量・動的計画法～

鹿島久嗣

DEPARTMENT OF INTELLIGENCE SCIENCE  
AND TECHNOLOGY

# 順序統計量

## 順序統計量：

小さい方から $k$ 番目の要素は線形時間で発見可能

- 順序統計量：小さい方から $k$ 番目の要素
  - 自明なやり方：ソートを使えば $O(n \log n)$
  - 工夫すれば $O(n)$ で可能：
    - 平均的に $O(n)$ で見つける方法 (前回)
    - **最悪ケースで $O(n)$ で見つける方法** (今回)
- の二つのやり方を紹介する

平均 $O(n)$ の順序統計量アルゴリズム：

クイックソートと同じ考え方で可能だが、最悪ケースで $O(n^2)$

- $q \leftarrow \text{Partition}(A, p, r)$  の結果 :

配列 $A[p, r]$ を枢軸以下の要素と  
大きい要素に分け  $q$ の前後に分割

1.  $k \leq q$  であれば、求める要素は $A[p: q]$ にある
2.  $k > q$  であれば、求める要素は $A[q + 1: r]$ にある

—再帰的にPartitionを呼ぶことで範囲を限定していく

- 平均的には問題サイズは半々になっていくので $O(n)$

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n) = O(n)$$

- 最悪ケースでは問題サイズは定数しか減らないので $O(n^2)$

- 問題サイズが確実に比率で減っていくようにしたい

# 最悪 $O(n)$ の順序統計量アルゴリズム： うまく「だいたい真ん中」をとってくる

- Order( $A, k$ ) :  $A$ の中から $k$ 番目に小さい要素を見つける
  - 1.  $A$ を5個ずつのグループに分け、各グループをソートして中央値（3番目の値）を見つけ、これらを集めて $T$ とする（定数個の要素のソートは定数時間でできることに注意）
  - 2.  $T$ の中央値 $m$ をみつける Order( $T, \lfloor n/10 \rfloor$ )
  - 3.  $A$ を $m$ より小さいもの ( $S_1$ )、同じもの ( $S_2$ )、大きいもの ( $S_3$ ) に分割する
  - 4. (i)  $k \leq |S_1|$ ならば Order( $S_1, k$ ) を実行  
(ii)  $|S_1| < k \leq |S_1| + |S_2|$  ならば  $m$  は目的の要素  
(iii)  $k > |S_1| + |S_2|$  ならば Order( $S_3, k - (|S_1| + |S_2|)$ ) を実行する。

# 最悪 $O(n)$ の順序統計量アルゴリズム： うまく「だいたい真ん中」をとってくる

- Order( $A, k$ ) :  $A$ の中から $k$ 番目に小さい要素を見つける

1.  $A$ を5個ずつのグループに分け、各グループをソートして中央値（3番目の値）を見つけ、これらを集めて $T$ とする（定数個の要素のソートは定数時間でできることに注意）
2.  $T$ の中央値 $m$ をみつける Order( $T, \lfloor n/10 \rfloor$ )


3.  $A$ を $m$ より小  
もの ( $S_3$ )

4. (i)  $k \leq |S_1|$

- (ii)  $|S_1| < k \leq |S_1| + |S_2|$

- (iii)  $k > |S_1| + |S_2|$

Order(



$(S_2)$ 、大きい

目的の要素

する。

# 最悪 $O(n)$ の順序統計量アルゴリズム： 計算量の漸化式

- $T(n) = O(n) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lceil \frac{3}{4}n \right\rceil\right) = O(n)$ 
  - ステップ4の分岐で (i)Order( $S_1, k$ ) が選ばれたとする
  - 中央値 $m$ 以上の要素が少なくとも $\frac{1}{4}n$ 個ある
  - したがって中央値より小さい要素数は最大 $\frac{3}{4}n$ 個
- 直観的には「各グループの中央値を集めた中の中央値は概ね全体の中央値になっている」
  - 全体を分割した小グループのそれぞれの中央値をあつめてその中央値をとると、おおむね全体の中央値が取れるはず

# 最悪 $O(n)$ の順序統計量アルゴリズム： 計算量の漸化式

- $T(n) = O(n) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lceil \frac{3}{4}n \right\rceil\right) = O(n)$


- ステップ4の分岐で (i)Order( $S_1, k$ ) が選ばれたとする

- 中央値 $m$ 以上の要素が少なくとも $\frac{1}{4}n$ 個ある

- したがって中央値

- 直観的には「各概ね全体の中

- 全体を分割し、その中央値を



最大  $\frac{3}{4}n$  個

た中の中の中央値は

中央値をあつめて  
中央値が取れるはず

# 最悪 $O(n)$ の順序統計量アルゴリズム： 計算量の導出

- 定理： $s_1 + s_2 + \cdots + s_d < 1$ として

$$T(n)$$

$$= \begin{cases} c & (n \leq n_0) \\ T(s_1 n) + T(s_2 n) + \cdots + T(s_d n) + c' n & (n > n_0) \end{cases}$$

$$\text{とするとき、 } T(n) \leq \frac{cn}{1-(s_1+s_2+\cdots+s_d)} = O(n)$$


- 今回のケースでは $s_1 = \frac{1}{5}, s_2 = \frac{3}{4}$ であり、 の定理を使うと  
 $T(n) = O(n)$

# 動的計画法

# 動的計画法：

問題を再帰的に分割しボトムアップに解く

- 動的計画法と分割統治法はともに問題を再帰的に分割
  - 分割統治法：トップダウン
  - 動的計画法：ボトムアップ
- 動的計画法の流れ


1. 問題の構造を再帰的に捉える
  2. 解を再帰的に構成する
  3. ボトムアップで解を計算する
- 
- 分割統治法  
と同じ

# 動的計画法のポイント： 解の使いまわしによる効率化

- 分割された問題が重複している場合に差が生じる
  - トップダウンでは同じ問題を何度も解くことになる
  - ボトムアップでは解の使いまわしが可能
  - 両者に指數的な差が生じうる
- 逆にいえば、部分問題が重複していることが動的計画法の力ギ

# 動的計画法のポイント： 解の使いまわしによる効率化


- 分割された問題が重複している場合に差が生じる



- 部分問題が重複していることが動的計画法の力ギ

# 動的計画法の例： 複数の行列積の計算

- 入力： 行列  $A_1, A_2, \dots, A_n$



- 出力： 積  $A_1 A_2 \cdots A_n (= A_{1,\dots,n})$

- 掛け算できる前提

–  $A_i A_{i+1}$  の計算は  $O(p_{i-1} p_i p_{i+1})$  かかる

- $A_1: 10 \times 100, A_2: 100 \times 5, A_3: 5 \times 50$  とすると：

–  $((A_1 A_2) A_3) = 7500$

–  $(A_1 (A_2 A_3)) = 75000$

解の構成における観察：

全体の最適解は部分最適解の組合せで作られている

- $A_1 A_2 \cdots A_n (= A_{1,\dots,n})$  の計算において、 $k$ 番目の分割が最後にくるとする
  - つまり  $A_{1,\dots,k}$  と  $A_{k+1,\dots,n}$  を別々に計算して最後に統合する
    - ちなみに、最後の統合コストは  $O(p_0 p_k p_n)$
  - これが最適解であるなら、 $A_{1,\dots,k}$  と  $A_{k+1,\dots,n}$  の計算コストもそれぞれ最小のはず（部分問題の最適解のはず）
    - 理由：そうでなければ、それをコスト最小のものに置き換えるだけで、全体のコストがもっと下がるはず
  - つまり、全体最適な解は、部分最適な解でつくられている

解の構成における観察：

全体の最適解は部分最適解の組合せで作られている

- $A_1 A_2 \cdots A_n (= A_{1,\dots,n})$  の計算において、 $k$ 番目の分割が最後にくるとする


—つまり  $A_{1,\dots,k}$  と  $A_{k+1,\dots,n}$  を別々に計算して最後に統合する

- ちなみに、最後の統合コストは  $O(p_0 p_k p_n)$

- これが最適解である（計算コストも最小）

—理由：そうすると、  
換えるだけで

- つまり、全体



の計算コストも  
最小

のものに置き  
換えるだけ

くられている

# 最小コストについて成り立つ再帰式：

部分行列積の最適解を組合わせて大きな最適解をつくる

- $A_{i,\dots,j}$  を計算する最小のコストを  $m[i, j]$  とする
- $m[i, j]$  は再帰的に表現できる：

$$m[i, j]$$

$$= \begin{cases} 0 & (i = j) \\ \min_{i \leq k < j} m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1} p_k p_j & (i \neq j) \end{cases}$$

どこで分割するのが  
最良か？

前半の最小  
計算コスト

後半の最小  
計算コスト


統合（掛け算）  
のコスト

# 最小コストについて成り立つ再帰式・ 部分行列積の最短ルート

- $A_{i,\dots,j}$  を計算する
- $m[i, j]$  は再帰的

解をつくる

ここで分割する場合



$m[i, j]$

$$= \begin{cases} 0 & (i = j) \\ \min_{i \leq k < j} m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1} p_k p_j & (i \neq j) \end{cases}$$

どこで分割するのが  
最良か？

前半の最小  
計算コスト

後半の最小  
計算コスト

統合（掛け算）  
のコスト

動的計画法の計算量：

ボトムアップ計算により多項式時間で解が求まる

■再帰式の適用により最小の $m[1, n]$ を求める

■「ボトムアップ」で計算：

1.  $i = j$  の場合について計算 (全部ゼロ ;  $m[i, i] = 0$ )

2.  $i = j - 1$  の場合について計算 ( $m[i, i + 1]$ )

3.  $i = j - 2$  の場合について計算 ( $m[i, i + 2]$ )

4. ...

-上記が $n$ ステップ、それぞれで $O(n)$ 個の再帰式評価、それぞれの評価に $O(n)$ 必要なので、全部で $O(n^3)$ の計算量

■バックトラック：各再帰式での最良の $k$ を記憶しておくことで実際の掛け算の順番を得る

動的計画法の計算量：

ボトムアップ計算により多項式時間で解が求まる

■再帰式の適用により最小の $m[1, n]$ を求める

■「ボトムアップ」で計算：

1.  $i = j$  の場合について計算 (全部ゼロ ;  $m[i, i] = 0$ )
2.  $i = j - 1$  の場合について計算 ( $m[i, i + 1]$ )
3.  $i = j - 2$  の場合について計算 ( $m[i, i + 2]$ )
4. ...


-上記が $n$ ステップ  
-それの評価

■バックトラック  
実際の掛け算

3.  $i = j - 2$

2.  $i = j - 1$

1.  $i = j$



、それ  
算量  
ことで

動的計画法でやらないと... :  
指数的な計算量になる

- 解きたい再帰式 :

$$m[i, j] = \begin{cases} 0 & (i = j) \\ \min_{i \leq k < j} m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1} p_k p_j & (i \neq j) \end{cases}$$

- トップダウン計算（分割統治）だと指数的な計算量になる

$$T(n) = \sum_{k=1}^{n-1} (T(k) + T(n - k) + c) = 2 \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + cn = O(2^n)$$

# 最長共通部分系列問題：

2つの系列に共通に含まれる最長の部分系列をみつける

- 系列  $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$  の部分系列(subsequence)とは  $X$ からいくつかの要素を取り除いたもの
- 2つの系列  $X$  と  $Y$  に対して、系列  $Z$  が両方の部分系列のときこれを共通部分系列とよぶ
- 最長共通部分系列(LCS; Longest Common Sequence)：
  - 入力：2つの系列  
$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m), Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$
  - 出力：  $X$  と  $Y$  の LCS  $Z = (z_1, z_2, \dots, z_k)$  をひとつ

# 最長共通部分系列問題：

2つの系列に共通に含まれる最長の部分系列をみつける

- 系列  $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$  の部分系列(subsequence)とは  $X$ からいくつかの要素を取り除いたもの

- 2つの系列  $X, Y$  これを共通

- 最長共通部分系列問題  
- 入力 : 2つの文字列

$$X = (a, b, c, b, d, a, b)$$

$$Y = (b, c, d, b)$$

系列のとき

(subsequence) :

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m), Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

- 出力 :  $X$ と $Y$ のLCS  $Z = (z_1, z_2, \dots, z_k)$  をひとつ

# 最長共通部分系列問題：

2つの系列に共通に含まれる最長の部分系列をみつける

- 系列  $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$  と  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  の部分系列(subsequence)とは  $X$  からいくつかの要素を削除して得られる

$$Y = (b, d, c, a, b, a)$$

$$X = (b, c, a)$$

$$X = (a, b, c, b, d, a, b)$$

の部分系列のとき

- 2つの系列  $X$  と  $Y$  の共通部分系列を  $Z$  とする。これを共通部分子列(subsequence)と呼ぶ

- 最長共通部分系列(LCS; Longest Common Sequence) :

- 入力 : 2つの系列

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m), Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

- 出力 :  $X$  と  $Y$  の LCS  $Z = (z_1, z_2, \dots, z_k)$  をひとつ


## 最長共通部分系列の性質： LCSも再帰的な構造をもつ

- $Z = (z_1, z_2, \dots, z_k)$  を  $X$  と  $Y$  の任意の LCS とすると
  - ①  $x_m = y_n$  のとき、 $x_m = y_n = z_k$  で、  
また、 $Z_{k-1} = (z_1, z_2, \dots, z_{k-1})$  は  $X_{m-1}$  と  $Y_{n-1}$  の LCS
    - つまり、最後の文字が一致していれば、  
 $x_m = y_n = z_k$  として LCS を 1 つ伸ばせる
  - ②  $x_m \neq y_n$  かつ  $z_k \neq x_m$  ならば、 $Z$  は  $X_{m-1}$  と  $Y$  の LCS
  - ③  $x_m \neq y_n$  かつ  $z_k \neq y_n$  ならば、 $Z$  は  $X$  と  $Y_{n-1}$  の LCS
    - つまり、一致していなければ、単にスキップ

# 最長共通部分系列の性質： LCSも再帰的な構造をもつ

- $Z = (z_1, z_2, \dots, z_k)$  を  $X$ と $Y$ の任意のLCSとすると

- ①  $x_m = y_n$  のとき、 $x_m = y_n = z_k$  で、  
また、 $Z_{k-1} = (z_1, z_2, \dots, z_{k-1})$  は  $X_{m-1}$ と $Y_{n-1}$  のLCS
  - つまり、最後の文字が一致していれば、  
 $x_m = y_n = z_k$  として LCSを1つ伸ばせる



LCSの長さについて成り立つ再帰式：  
動的計画法により $O(mn)$ で計算できる

- $X_i$ と $Y_j$ とのLCSの長さを $c[i, j]$ とする

- $c[i, j] = \max$

$$\begin{cases} 0 & (i = 0 \text{ または } j = 0) \\ c[i - 1, j - 1] + 1 & (x_i = y_j) \leftarrow \textcircled{1} \\ \max\{c[i, j - 1], c[i - 1, j]\} & (x_i \neq y_j) \leftarrow \textcircled{2}\textcircled{3} \end{cases}$$

- $c[m, n]$ が $O(mn)$ で求まる

解の構成：

実際の解はバックトラックで求まる

- LCSはバックトラックで構成できる

- 注：LCSは複数ありうる  
(最適な経路は複数ありうる)

- 例：

- $-X = (a, \textcolor{red}{b}, c, \textcolor{red}{b}, d, a, b)$

- $-Y = (\textcolor{red}{b}, d, \textcolor{red}{c}, a, \textcolor{red}{b}, a)$

- $-Z = (\textcolor{red}{b}, c, b, a)$

